



Guías de autocuidados Recomendaciones del enfermero/a y procedimiento terapéutico

17.2. Vacuna Hepatitis A

Las recomendaciones de vacunación están basadas en criterios de eficacia de los productos inmunológicos, con el objeto de evitar enfermedades infecciosas susceptibles de vacunación y siempre con el soporte y el conocimiento científico de las autoridades sanitarias y profesionales dedicadas al terreno de la inmunización.

En casos de vacunación incompleta se recomienda no iniciar de nuevo la pauta vacunal, sino completarla: "DOSIS PUESTA, DOSIS CONTADA" .

¿Qué es la Hepatitis A?

La Hepatitis A es una enfermedad infecciosa que se transmite fundamentalmente a través de las heces, tomando alimentos o bebidas preparadas por alguien que ha tocado excremento infectado.

¿Qué podemos hacer para prevenirla?

Para prevenir la Hepatitis A, debemos estar correctamente vacunado/as, siguiendo la pauta de administración establecida y manteniendo medidas higiénicas a la hora de tomar o preparar alimentos, o bien al entrar en contacto con fluidos corporales de personas infectadas o con aguas residuales.

Pauta de administración

La inmunización primaria se consigue con una dosis única. Para proporcionar una protección a largo plazo se debe administrar una dosis 6 o 12 meses después. En población nacida antes de 1970 se debe hacer un control prevacunal, dado que es probable que esté inmunizada de forma natural por exposición previa al virus, siendo innecesaria la vacunación.

Efectos adversos

En algunos casos se pueden observar manifestaciones locales (dolor y enrojecimiento en la zona de inyección), así como reacciones generales leves y de corta duración (dolor de cabeza, fiebre, náuseas).

En caso de duda, consulte con el personal sanitario del centro asistencial

Recomendaciones individuales